

### پلاویکس برای چه استفاده می‌شوند؟

پلاویکس برای بیمارانی با سوابق زیر تجویز می‌گردند:

- بیماری عروق کرونری
- سکته‌ی قلبی
- سکته‌ی مغزی و حمله‌ی ایسکمی گذرا (TIA)
- بیماری سرخرگ محیطی
- پس از آنژیوپلاستی و قرار دادن استنت.
- پس از جراحی بای پس قلبی یا تعویض دریچه.
- برای جلوگیری از شکل‌گیری لخته‌ی خون در افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی.

### پلاویکس چگونه مصرف می‌شوند؟

این دارو معمولاً یک یا دو مرتبه در روز مصرف می‌شود و بهتر است با معده‌ی خالی مصرف نشوند. در صورت داشتن حساسیت به آسپرین، ایبوپروفن یا ناپروکسن، پیش از تجویز دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

افرادی که دارای مشکلات خونریزی و زخم دستگاہ گوارش بوده، و یا افرادی که عمل جراحی شامل جراحی دندان خواهند داشت، بایستی پیش از مصرف این داروها با پزشک خود صحبت کنند، زیرا این داروها ممکن است منجر به خونریزی بیش از حد شوند. شما نباید مصرف داروهای ضد پلاکتی خود را متوقف کنید، مگر اینکه پزشک به شما دستور بدهد.

هنگام مصرف این ضد پلاکتها ، از پزشک خود بپرسید که از چه داروهایی برای تسکین درد یا سرماخوردگی جزئی می‌توانید استفاده نمایید. برچسب‌های مسکن‌ها و داروهای سرماخوردگی دیگر را بخوانید تا مطمئن شوید که آنها دارای آسپرین نیستند. داروهایی که دارای آسپرین بوده و یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، ممکن است در هنگام مصرف با داروهای ضد پلاکتی، منجر به مشکلات خونریزی گردد. پیش از هر عمل جراحی، اعمال دندانپزشکی یا درمان اورژانسی، به پزشک یا دندانپزشک اطلاع دهید که در حال مصرف اینگونه دارو هستید. ممکن است شما به مصرف این دارو برای 5 تا 7 روز پیش از جراحی یا کار دندان پزشکی، نیاز داشته باشید. اما مصرف این دارو را، بدون مشورت اولیه با پزشکتان، متوقف نکنید.

### آیا پلاویکس عوارض جانبی دارد؟

ضد پلاکتها ممکن است عوارض جانبی داشته باشند. حالت تهوع، ناراحتی معده، دل درد، اسهال، جوش و خارش، رایج‌ترین عوارض جانبی این قرصها میباشند. به منظور کاهش حالت تهوع و ناراحتی معده، این داروها را به همراه وعده‌های غذایی مصرف نمایید. اگر این عوارض جانبی شدید بوده و از بین نمی‌روند، با پزشک خود تماس بگیرید.

به افرادی که پلاویکس مصرف می‌کنند توصیه می‌شود تا در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر، بلافاصله با پزشک خودشان تماس بگیرند:

- هرگونه علامت خونریزی غیر عادی از قبیل خون در ادرار یا مدفوع، خون دماغ، هر کبودی غیر عادی، خونریزی شدید از بریدگی‌ها، مدفوع سیاه و قیر مانند، سرفه به همراه خون، خونریزی شدید و غیر طبیعی در حین عادت ماهانه و استفراغ خونی باشد.

- گیجی
- سردرد شدید
- دشواری در بلع
- تنگی نفس شدید
- صدای زنگ در گوش
- درد معده‌ی شدید

### در صورت فراموشی یک نوبت دارو

به محض این که به یاد آوردید ، دارو را مصرف کنید. در صورتی که تقریباً نوبت بعدی فرا رسیده است، لازم نیست نوبت فراموش شده را جبران کنید. نباید برای جبران نوبت از دست رفته، داروی بیشتری مصرف کنید. یعنی نباید در نوبت بعدی، دو برابر مصرف کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
درمانی استان سمنان

## داروهای ضد پلاکتی

### کلوپییدوگرل (پلاویکس - اسویکس)



تهیه کننده: فاطمه حیدری

کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

با همکاری: دکتر رجا ولی پور

متخصص بیماری های قلب و عروق



### منابع:

داروهای ژنریک ایران تالیف مرجان رسولی

drugs.com

## هنگام مصرف پلاویکس از چه کارهایی باید اجتناب نمود؟

از فعالیت هایی که خطر خونریزی یا جراحی را افزایش می دهد، پرهیز کنید. هنگام مسواک زدن یا اصلاح کردن بیشتر مراقب جلوگیری از زخم و خونریزی باشید. از مصرف الکل پرهیز کنید چرا که خطر خونریزی معده یا روده را افزایش می دهد

نکته مهم:

برای بیمارانی که تحت عمل بالن (آنژیوپلاستی) قرار می گیرند مصرف روزانه این دارو از هفت روز قبل از عمل شروع میشود و ادامه آن بعد از عمل با توجه به نظر پزشک ممکن است

تاچندسال ادامه یابد **لذا از قطع خودسرانه این**

**دارو جدا اجتناب کنید**، زیرا عدم مصرف این

دارو می تواند با تولید لخته در عروق قلب سبب مرگ ناگهانی گردد.